IMPORTANCIA DE LOS ESTUDIOS DE GEOLOGÍA MARINA EN LA PREVENCIÓN DEL RIESGO DE MAREMOTOS

INSTITUTO ESPAÑOL DE OCEANOGRAFÍA

Dr. Juan Tomás Vázquez Garrido
Científico Titular

- **Geomorfología**
- **Sedimentología y tipos de fondos**
- **Localización y caracterización de las fuentes tsunamigénicas**

- **Procesos geológicos generadores de riesgo.**
- **Evolución y modelización de los procesos geológicos marinos.**

Técnicas de estudio en Geología Marina

a) **OBSERVACIÓN DEL FONDO:** TV, Vídeo, Fotografía submarina, ROV (control remoto). Estaciones de observación. Imágenes de satélite.

b) **ACUSTICOS**

Ecosondas

Sonar de Barrido Lateral

c) **SISMICOS**

Alta resolución/baja penetración

Media resolución/Media penetración

Alta penetración/Baja resolución

d) **OBTENCIÓN DE SEDIMENTOS Y ROCAS**

Flota del IEO

**ROV LIROPUS 2000
SUPER MAHAWK //**

Otro buques: MINECO y ARMADA

Sarmiento de Gamboa 70 m

Otros buques:

- García del Cid
- Buques Hidrográficos de la Armada

Hespérides 84 m

Otros buques españoles: MAGRAMA

Vizconde de Eza 53 m

Emma Bardán 29 m

Miguel Oliver 70 m

Secretaría General
de Pesca

Sistemas Acústicos

Chiocci,
2004

Ecosonda Multihaz

CAMPAÑA AN

**Observación Directa:
ROV, Vídeo,
Fotografía
submarina.
Estaciones de
observación.
Imágenes de satélite.**

Sistemas Sísmicos

Extracción de sedimentos y rocas

Que datos se aportan de forma directa a los sistemas de prevención de riesgos de tsunamis:
MODELOS BATIMÉTRICOS DE LOS FONDOS OCEÁNICOS

**Instituto Hidrográfico de la Marina
MAGRAMA**

Proyectos de investigación (nacionales, autonómicos o internacionales) liderados por distintos organismos de investigación o universidades – CSIC, IEO, IGME, etc.

Proyectos de empresa

CARTOGRAFÍA BATIMÉTRICA DEL FONDO MARINO

AUMENTO DE LA RESOLUCIÓN AUMENTO DE LA PRECISIÓN DE LOS MODELOS

Profundidad

388 m

596 m

Tapetes de consorcios bacterianos

Subcircular collapse depression

Drift erosional depressions

Collapse depression

Drift erosional depression

Profundidad
457 m

RECONOCIMIENTO Y EVALUACIÓN DE FUENTES TSUNAMIGÉNICAS POTENCIALES

- Terremotos y Movimientos de fallas
- Grandes deslizamientos submarinos
- Erupciones volcánicas

- Expulsiones violentas de gas
- Deslizamientos terrestres
- Meteoritos

RIESGOS LIGADOS A LA ACTIVIDAD TECTÓNICA

Movimiento de fallas y terremotos

Asentamientos diferenciales: subsidencia

Fenómenos de elevación ligados a diapirismo

Formación de tsunamis

Tectónica Activa

Falla de Carboneras / La Serrata, Mar de Alborán.

100 km de longitud bajo el mar. Presenta roturas de la superficie del fondo en forma de escarpes, depresiones, crestas compresivas, así como deflexión de canales y control de la red de drenaje.

NW

SE

Tectónica Activa

Fallas normales con saltos de falla de pequeña magnitud, de 4 a > 10 ms TD, afectando a unidades postglaciares. Se estima un gradiente de desplazamiento entre 0.1 y 0.2 mm/a en los últimos 18000 a.

Vázquez et al., 2010

Alta resolución

Cañón de Lagos

Falla de la Herradura Golfo de Cádiz

Análisis de la Recurrencia de terremotos

Arquitectura de crecimiento de las secuencias sedimentarias.
Criterios para establecer la historia de desplazamiento de la falla y, si la resolución es suficientemente alta, para determinar el desplazamiento vertical cosísmico.

Se necesita que la deformación de las unidades sedimentarias (estratos) sea simultánea con los procesos de sedimentación que las generan (syn-tectónica)
Establecimiento de un modelo estratigráfico de las formaciones postglaciales.

- Un incremento en el desplazamiento de la falla está producido por un terremoto, interpretan hasta 8 terremotos generados por la falla en los últimos 18000 años.
- Último evento: ~2000 a BP
 - Desplazamiento cosísmico vertical: ~0.5-6 m
 - Intervalo de recurrencia: 900 a >3000 a (promedio ~2000 a)
 - Deficit de desplazamiento vertical: 2-3 m
 - Deficit de desplazamiento dextral: 6-15 m

Deslizamientos en márgenes continentales e islas oceánicas

Localización de los deslizamientos en superficie

Strike-slip fault	Syncline	Reverse fault
Normal fault	Anticline	Undifferentiated fault
Normal fault with strike-slip Component	Inferred fault direction	
Reverse fault with strike-slip Component		

Alonso et al., 2014

Análisis de la actividad: reconocimiento de los deslizamientos en el registro sedimentario

Actividad volcánica

Las erupciones son peligrosas en aguas someras pudiendo producir tsunamis, en aguas profundas la presión del agua impide las erupciones explosivas

Nishino-shima (Japón)
Erupción 1973-1974
Elevación: 38 m
Isla: de 700 m de ancho

Stromboli

T.I.VOLI CRUISE
4/9-5/10 1998

Deslizamientos submarinos

PTEROS - EL HIERRO

Deslizamientos y avalanchas rocosas submarinas en Canarias

DESLIZAMIENTOS DE LAS ISLAS CANARIAS

FUERTEVENTURA

1. Puerto del Rosario. 16 M. a.
2. Puerto del Rosario Sur. 18 M. a.
3. Jandía Sur.

GRAN CANARIA

4. Las Palmas. 9 M. a.; 4-3.5 M. a.
5. Galdar. 4-3.5 M. a.
6. Norte. 14-12. M. a.
7. Agaete. 14-12 M. a.
8. Roque Nublo. 4-3.5 M. a.
9. Horgazales. 14.1 M. a.
10. Noroeste. 14 M. a.

TENERIFE

11. Los Gigantes-Los Carrizales. 6 M. a.
12. Arco de Taganana. 4, 5 M. a.
13. Tamadaba. 2.5 M. a.
14. Los Rogues de García. 0.6-0.7 M. a.
15. Santa Úrsula-Mincheque. 1.1 M. a.
16. GÜlmar. 1 M. a.
17. Abona. 0.73 M. a. La Orotava. 0,6 M. a.
18. La Orotava. 0,6 M. a.
19. Las Cañadas-Valle de Icod. 0,20-0,16 M. a.

LA GOMERA

20. Tazo. 9.4 M. a.

LA PALMA

21. Santa Cruz de La Palma. 1.38-1.08 M. a.
22. Playa de la Veta-I. 1.48-1.20? M. a.
23. Playa de la Veta-II. 1.02-0.85 M. a.
24. Cumbre Nueva. 0.58 M. a.

EL HIERRO

25. Las Playas-I. 0,545-0,176 M. a.
26. El Julán. >0,16 M. a.
27. Las Playas-II. 0,178-0,145 M. a.
28. El Golfo. 0,087-0,039 M. a.

DEPÓSITOS DE TSUNAMIS EN CANARIAS

GRAN CANARIA

1. Agaete. Relacionado con el deslizamiento de GÜlmar (nº 16).
2. Piedra Alta.

TENERIFE

2. Teno-Buenavista. Relacionado con el deslizamiento de Las Cañadas (nº 19).

- Depósitos de Tsunami
- Megabloques submarinos
- Prolongación submarina de deslizamiento
- Anfiteatros de deslizamientos
- Islas

Evolución y modelización de los procesos geológicos marinos: un ejemplo en el Mar de Alboran

Propagación

Propagación en el Mar Alborán

POSIBLES ACCIONES A DESARROLLAR: Riesgos geológicos en el medio marino

RIESGOS GEOLÓGICOS

INTERNOS

- SUBCONSOLIDACIÓN
- TASA DE SEDIMENTACIÓN
- PRESENCIA DE GAS EN EL SEDIMENTO
- MOVIMIENTOS EN MASA

EXTERNOS

DINÁMICA OCEÁNICA

- MAREAS
- OLAS
- CORRIENTES
- CAMBIOS DE NIVEL DEL MAR
- TSUNAMIS

DINÁMICA GEOLÓGICA

- TECTÓNICA
- TERREMOTOS
- SUBSIDENCIA
- MIGRACIÓN DE FLUIDOS: DIAPIROS
- VOLCANES
- TSUNAMIS

POSIBLES ACCIONES A DESARROLLAR: Monitorización de Estructuras Potenciales

SEGUIMIENTO PERIÓDICO DE ESTRUCTURAS POTENCIALES CONCRETAS:

- Batimetría de Alta Resolución
- Perfiles Sísmicos de Alta Resolución
- Construcción de Modelos de Interferencia y 4d
- Evaluar la relación entre tectónica activa, movimientos gravitacionales masivos (deslizamientos) y tsunamis
- Evaluar el potencial y el comportamiento actual de estructuras geológicas generadoras de Riesgo

Metodología de trabajo para el análisis de la tectónica activa en un sector del margen continental

Reconocimiento de las principales estructuras tectónicas activas.

Caracterizar las estructuras activas, establecer la cronología de su actividad y su periodo de recurrencia.

Modelar la evolución de los procesos tectónicos a lo largo del Pleistoceno, Holoceno y potencial futuro.

Monitorizar el movimiento de la estructuras de primer orden seleccionadas a largo plazo.

Muchas Gracias

<http://www.ma.ieo.es/gemar>

https://twitter.com/gemar_ieo

<https://www.facebook.com/geociencias.ieo>

<http://www.youtube.com/user/GEMARIEO>